

1.º TESTE DE CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - Versão A
LEGM, MEC
1.º Sem. 2017/18 11/11/2017, 9h Duração: 1h30m
Apresente todos os cálculos e justificações relevantes.

(2,5 val.)

- 1.** Considere os conjuntos $A = \{x \in \mathbb{R} : |x^2 - 1| \leq 2\}$, D o domínio da função dada por $h(x) = \arccos(2 - x)$ e $B = A \cap D$.
- Escreva A e D como um intervalo ou uma união de intervalos e mostre que $B = [1, \sqrt{3}]$.
 - Determine, caso exista em \mathbb{R} , $\inf(B \cap \mathbb{Q})$, $\max(B \cap \mathbb{Q})$, $\min(B \setminus \mathbb{Q})$, $\sup(B \setminus \mathbb{Q})$.

(3,0 val.)

- 2.** Considere a sucessão *crescente* definida por recorrência por

$$u_1 = 0, \quad u_{n+1} = \sqrt{\frac{u_n^2 + 1}{2}}.$$

- Mostre por indução matemática que $u_n < 1$, para qualquer $n \in \mathbb{N}$.
- Pode concluir que u_n é convergente em \mathbb{R} ? Justifique e, em caso afirmativo, determine $\lim u_n$.

(2,5 val.)

- 3.** Calcule, ou justifique que não existe em $\overline{\mathbb{R}}$, o limite de cada uma das seguintes sucessões:

$$\left(\frac{n\pi}{2} \right) \cdot \frac{\sqrt{2n+1}}{2+\sqrt{n}}, \quad \frac{(n+1)! + (n+1)2^n}{2n \cdot n! + n^8}.$$

(2,5 val.)

- 4.** Calcule cada um dos seguintes limites, caso exista em $\overline{\mathbb{R}}$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{[1 + \cos(x^2 + \sqrt{x})]^2}{x-1}, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\ln(e + 2x) \right]^{\frac{1}{\sin x}}.$$

(6,0 val.)

- 5.** Considere $f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = \begin{cases} (x-1)^2 e^{-\frac{1}{x-1}}, & \text{se } x > 1 \\ \arctan[(x-1)^2], & \text{se } x < 1. \end{cases}$$

- Calcule $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- Mostre que f é prolongável por continuidade ao ponto $x = 1$.
- Designando por F esse prolongamento, estude F quanto à diferenciabilidade em $x = 1$ e determine a função F' .
- Estude F quanto à monotonía e existência de extremos locais e absolutos. Indique, justificando, o contradomínio de F .

(1,5 val.)

- 6.** Prove que a equação $e^{2x} = 4 - x^2$ tem exactamente duas soluções em \mathbb{R} .

(2,0 val.)

- 7.** Seja $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua e (a_n) uma sucessão real tal que $a_n \rightarrow +\infty$. Mostre que se $g\left(\frac{1}{a_n}\right) = g(a_n)$, para qualquer $n \in \mathbb{N}$, e $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = b \in \mathbb{R}$, então g tem um máximo $g(c)$ em $[0, +\infty[$ e $g(c) \geq b$.