

Cálculo Diferencial e Integral II
Cursos: LEEC, LEMec, LEAN, LEAer, LEFT
Exame Recurso - 18 de Julho de 2022 - 8h
Duração: 2 horas

Resolução abreviada

1. Seja $h : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$ a função definida por

$$h(x, y) = \frac{x^2}{\sqrt{2x^2 + 3y^2}}.$$

- (2 val.) Determine, justificando, se existe $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} h(x, y)$.

Resolução:

Temos,

$$0 \leq h \leq \frac{x^2}{\sqrt{2}|x|} = \frac{1}{\sqrt{2}}|x| \rightarrow 0.$$

Logo,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} h(x, y) = 0.$$

- (2 val.) 2. Seja $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ uma função de classe C^1 tal que

$$Dg(1, 1) = \begin{bmatrix} 2 & a \\ b & 1 \end{bmatrix}.$$

Determine a e b sabendo que

$$\frac{\partial g}{\partial v}(1, 1) = (2, 3)$$

para $v = (5, 7)$.

Resolução:

Temos, uma vez que g é de classe C^1 e portanto diferenciável,

$$\frac{\partial g}{\partial v}(1, 1) = Dg(1, 1) \cdot v.$$

Logo, $10 + 7a = 2$ e $5b + 7 = 3$, pelo que $a = -8/7, b = -4/5$.

- (3 val.) 3. Determine e classifique os pontos críticos da função $f(x, y) = x + (1 - x^2)y$.

Resolução:

O sistema de equações

$$\nabla f(x, y) = (1 - 2xy, (1 - x^2)) = (0, 0)$$

tem as soluções $p_1 = (-1, -\frac{1}{2})$ e $p_2 = (1, \frac{1}{2})$. Temos a Hessiana,

$$H_f(x, y) = \begin{bmatrix} -2y & -2x \\ -2x & 0 \end{bmatrix}.$$

O determinante da Hessiana de f em p_1, p_2 é negativo, pelo que ela tem valores próprios de sinais opostos sendo, portanto, p_1, p_2 pontos em sela.

4. Considere o sistema de equações

$$\begin{cases} \sin(x + y) + z + 3w = 3 \\ \sin(x + y) + 3z + w = 1. \end{cases}$$

(2 val.)

(a) Mostre que na vizinhança do ponto $(x, y, z, w) = (0, 0, 0, 1)$ o sistema define (x, z) como função de classe C^1 de (y, w) , ou seja, $(x, z) = f(y, w)$.

Resolução:

Seja $F(x, y, z, w) = (\sin(x + y) + z + 3w - 3, \sin(x + y) + 3z + w - 1)$. Temos,

$$\det \frac{\partial F}{\partial (x, z)}(0, 0, 0, 1) = 2 \neq 0.$$

O teorema da função implícita garante então que localmente, numa vizinhança aberta de $(0, 0, 0, 1)$, as soluções do sistema $F(x, y, z, w) = 0$ podem ser escritas na forma de um gráfico $(x, z) = f(y, w)$, com f de classe C^1 e $f(0, 1) = (0, 0)$.

(1 val.)

(b) Calcule $Df(0, 1)$.

Resolução:

Temos $f = (f_1, f_2)$ e

$$F(f_1(y, w), y, f_2(y, w), w) = 0$$

numa vizinhança aberta de $(y, w) = (0, 1)$. Derivando em y, w obtemos

$$Df(0, 1) = \begin{bmatrix} -1 & -4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

5. Considere

$$V = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 - 1 \leq z \leq 7 - 2\sqrt{x^2 + y^2}, y \geq 0 \right\}$$

(2 val.)

- (a) Escreva uma expressão para o volume de V usando integrais iterados da forma $\int(\int(\int dx) dy) dz$.

Resolução:

$$\text{Vol}(V) = \int_{-1}^3 \int_0^{\sqrt{z+1}} \int_{-\sqrt{z+1-y^2}}^{\sqrt{z+1-y^2}} 1 dx dy dz + \int_3^7 \int_0^{\frac{7-z}{2}} \int_{-\sqrt{\frac{(7-z)^2}{4}-y^2}}^{\sqrt{\frac{(7-z)^2}{4}-y^2}} 1 dx dy dz.$$

(3 val.)

- (b) Calcule o volume de V .

Resolução:

$$\text{Vol}(V) = \int_V 1 = \int_0^\pi \int_0^2 \int_{-1+\rho^2}^{7-2\rho} \rho dz d\rho d\theta = \frac{20}{3}\pi.$$

(2 val.)

6. Considere o campo vetorial $H(x, y) = (-y + 2xyf(x^2y), x + x^2f(x^2y))$, onde a função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é de classe C^1 . Determine o valor máximo do trabalho realizado pelo campo H ao longo da fronteira de um retângulo R inscrito numa circunferência de raio 1.

Resolução:

Temos

$$\left(\frac{\partial H_2}{\partial x} - \frac{\partial H_1}{\partial y} \right) = 2.$$

pelo teorema de Green, o trabalho será máximo para o retângulo R com maior área. Utilizando o método dos multiplicadores de Lagrange, verifica-se que esse retângulo é um quadrado de lado $\sqrt{2}$. Logo, o máximo do trabalho é 4.

(3 val.)

7. Seja $U \subset \mathbb{R}^2$ um aberto simplesmente conexo. Seja $F : U \rightarrow \mathbb{R}^2$ um campo vetorial de classe C^1 tal que para qualquer circunferência $C \subset U$,

$$\oint_C F = 0.$$

Determine se F tem, ou não, de ser gradiente em U .

Resolução:

Suponhamos que para $p \in U$,

$$\left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) (p) \neq 0.$$

Como F é de classe C^1 , por continuidade, teremos que a diferença das derivadas cruzadas de F terá o mesmo sinal num disco de raio positivo suficientemente pequeno, centrado em p . Pelo teorema de Green, o trabalho de F na fronteira desse disco não seria 0 o que é uma contradição. Logo, F é fechado e, sendo U simplesmente conexo, F é gradiente em U .