

Cálculo Diferencial e Integral III
1º Semestre 2024/25
Cursos: LEAmb, LEBiom, LEBiol, LEMat, LEQ

TESTE 1 (VERSÃO B)

17 DE OUTUBRO DE 2024, 19H

Apresente todos os cálculos e justificações relevantes.
Duração: 45m.

INSTRUÇÕES

- Não é permitida a utilização de quaisquer elementos de consulta nem de equipamentos electrónicos, incluindo máquinas de calcular.
- A utilização de telemóveis/smartphones é totalmente proibida. Devem estar desligados e arrumados durante toda a duração da prova.
- O teste deve ser resolvido a **caneta** (azul ou preta).

PERGUNTA	COTAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
1	5	
2	5	
3	5	
4	5	
Total	20 val.	

Nome: _____ Nº: _____

Curso: _____ Sala: _____

1. Considere o problema de valor inicial

$$y' = 4x^3 e^{y-3} \quad , \quad y(0) = 3$$

- (a) (4 val.) Determine explicitamente a solução do PVI.
- (b) (1 val.) Indique o intervalo máximo de existência da solução do PVI.

2024/25, 17/10/2024

1^o TESTE — B

LEAMB, LEBIOM, LEBIOL, LEMAT, LEQ

2. Considere o problema de valor inicial

$$t^2 y' - 2ty + h(t) = 0 \quad , \quad y(1) = \frac{1}{2}$$

em que $h(t)$ é uma função real de variável real.

- (a) (4 val.) Determine a solução do PVI no caso em que $h(t) = -2t$, indicando o intervalo máximo de solução.
- (b) (1 val.) Sem tentar resolver a equação, determine o intervalo máximo de existência da solução do PVI no caso em que $g(t) = \frac{1}{\cos t}$.

2024/25, 17/10/2024

1^o TESTE — B

LEAMB, LEBIOM, LEBIOL, LEMAT, LEQ

3. Considere a matriz

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

(a) (4 val.) Determine e^{At}

(b) (1 val.) Calcule a solução de $Y' = AY$, $Y(0) = (\alpha, 0, 0)$, onde α é um número real. Para que valores de α a solução é limitada?

2024/25, 17/10/2024

1^o TESTE — B

LEAMB, LEBIOM, LEBIOL, LEMAT, LEQ

4. Considere a equação diferencial

$$y'' + 9y = g(t)$$

em que $g(t)$ é uma função contínua em \mathbb{R} .

(a) (1 val.) Determine a solução geral da equação homogénea associada.

(b) (2 val.) Sendo $g(t) = -9t$, calcule a solução da equação que satisfaz $y(0) = 1$, $y'(0) = -1$.

(c) (2 val.) Determine uma solução particular da equação no caso em que $g(t) = \frac{9}{\sin(3t)}$ válida no intervalo $]0, \frac{\pi}{3}[$.

2024/25, 17/10/2024

1^o TESTE — B

LEAMB, LEBIOM, LEBIOL, LEMAT, LEQ